

شماره: ۶۶۵/۲۴۸۱۲  
تاریخ: ۱۴۰۰/۰۵/۱۲  
پیوست: ندارد



## معاونین محترم غذا و دارو دانشگاه/دانشکده های علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی سراسر کشور

موضوع: استفاده از محلول های تزریقی حاوی سدیم کلراید و دکستروز جهت آماده سازی داروی رمدسیور

با سلام و احترام؛

با توجه به سوالات مطرح شده در خصوص رقیق سازی داروی رمدسیور به استحضار می رساند، بر اساس راهنمای آژانس دارویی اروپا (EMA) و آخرین ویرایش کتاب *Injectable Drugs Guide*، استفاده از محلول های سدیم کلراید و دکستروز جهت آماده سازی این دارو برای تزریق مجاز می باشد. بنابراین استفاده از محلول های تزریقی وریدی (D/S، H/S، N/S) و 1/3.2/3 برای آماده سازی و تزریق داروی رمدسیور بلامانع است. خاطر نشان می گردد با توجه به اندیکاسیون مصرف کورتیکواستروئیدها در برخی از بیماران مبتلا به کووید-۱۹، در صورت استفاده از محلول های حاوی دکستروز، کنترل قندخون بیماران بایستی مدنظر قرار گیرد.

دکتر سید حیدر محمدی  
مدیر کل امور کلرو و مواد تحت کنترل