



## نکاتی پیرامون پیشگیری از مسمومیت کودکان

- داروهای خود را در مقابل چشم کودکان نخورید، چراکه کودکان از رفتار بزرگسالان تقلید می کنند و ممکن است دور از چشم والدین داروها را به دهان ببرند.
- اگر به کودک خود دارو می دهید به او تفهیم کنید که این دارو است و از کلماتی مثل آبنبات، شکلات و یا خوراکی استفاده نکنید.



کودکان زیر ۵ سال، پر خطر ترین گروه سنی از نظر مسمومیت می باشند.  
در سال ۹۸، ۱۸ درصد از موارد مسمومیت مراجعه شده به بیمارستان مربوط به کودکان بوده است.



برای کاهش تب در کودکان، داروی استامینوفن را بر اساس سن و وزن کودک و با مشورت پزشک و داروساز به کودک بدهید.  
مصرف مقادیر بالای استامینوفن می تواند منجر به مسمومیت و صدمات کبدی گردد.

مراکز اطلاع رسانی دارو ها و سموم در تمام کشور با شماره تماس ۱۹۰ و در شهرستان زابل با شماره تماس ۰۵۴۳۲۲۷۶۵۲ آماده پاسخگویی به سوالات شما عزیزان می باشد.